

# **MORTE SÚBITA: CAUSAS E FATORES DE RISCOS ASSOCIADOS EM UM ESTUDO DE NECROPSIAS NO IML DE IPATINGA-MG.**

Leandro Gustavo OLIVEIRA (FAMEVAÇO)

Objetivo: Avaliar as causas de morte súbita e correlacionar com fatores de riscos associados em necropsias realizadas no Serviço de Verificação de Óbitos(SVO) no Instituto Médico Legal(IML) de Ipatinga-Mg. Metodologia: Foram analisados os registros de necropsias referentes ao período compreendido entre janeiro de 2008 e janeiro de 2009 realizados pelo Serviço de Verificação de Óbito(SVO) do Instituto Médico Legal(IML) de Ipatinga-Mg e coletados dados como sexo, idade e causa morte, além de alguns aspectos anatomo-patológicos. Resultados: No período compreendido entre janeiro de 2008 e janeiro de 2009 foram analisados 558 laudos de necropsias, sendo que 119(21,32%) casos eram de morte súbita. A idade média foi de 54,21 anos, sendo que a idade mínima foi de 22 dias e a máxima de 93 anos. Em relação ao gênero, observou-se que 67,22% eram do sexo masculino e 32,77% do sexo feminino. A principal causa de morte súbita foi o infarto agudo do miocárdio(44,53%), seguido de edema agudo pulmonar(25,21%) e tamponamento cardíaco(6,72%). Conclusão: Há mais morte súbita entre homens do que entre mulheres, e essas morrem com idade mais avançada do que os homens. A principal causa relatada como morte súbita foi o infarto agudo do miocárdio e a aterosclerose foi o achado anatomopatológico mais prevalente.

Palavras-chave: Infarto agudo do miocárdio. Morte instantânea. Aterosclerose.