

RECOBRIMENTO RADICULAR PRÉVIO À ORTODONTIA: RELATO DE CASO

Alice Marcelino BELTRAME (Unileste); Célio Dhayrone de Sousa PAULINO (Unileste); Erick Simões BRAGA (Unileste); Meyri Duarte SANTOS (Unileste); Erika Storck CEZARIO (Unileste)

Introdução: A recessão periodontal pode ser definida como a migração apical da margem gengival a partir da junção cimento-esmalte levando à exposição da superfície. Essa alteração mucogengival tem etiologia multifatorial e sua ocorrência pode estar associada a prejuízo estético, hipersensibilidade dentinária e surgimento de cárie radicular. Diferentes técnicas cirúrgicas têm sido propostas para o tratamento das recessões periodontais sendo que o enxerto de tecido conjuntivo associado ao retalho reposicionado coronalmente é considerado o padrão ouro de terapia. **Objetivo:** O objetivo do presente trabalho é apresentar o relato de um caso clínico em que foi realizado o recobrimento das recessões múltiplas, por meio do enxerto de tecido conjuntivo associado ao retalho reposicionado apicalmente realizado previamente ao tratamento ortodôntico. **Metodologia:** Paciente sexo feminino, 59 anos de idade, sem complicações sistêmicas, procurou atendimento odontológico com queixa de recessões periodontais generalizadas nos dentes inferiores. Ao exame clínico, foram observadas recessões periodontais nos dentes 33 ao 43. Ao exame radiográfico observou-se perdas ósseas interproximais nesses dentes. O diagnóstico foi de recessão periodontal classe III de Miller (RT2 de Cairo). O tratamento proposto foi a realização de enxerto de tecido conjuntivo associado ao retalho reposicionado coronalmente. O enxerto foi obtido pela técnica da lâmina dupla e suturado na área receptora. As suturas foram removidas 14 dias após a cirurgia. **Resultados:** A remoção das suturas foi realizada 14 dias após a cirurgia. Foi observada clinicamente uma redução das recessões periodontais. 30 dias depois do procedimento cirúrgico houve uma modificação do fenótipo gengival, que se tornou mais espesso. Três meses depois da cirurgia a estabilidade dos tecidos moles periodontais foi verificada e a paciente foi liberada para iniciar o tratamento ortodôntico. **Conclusão:** Com o presente trabalho pode-se concluir que a terapia cirúrgica das recessões periodontais nos dentes 33 ao 43 permitiu o recobrimento radicular desses dentes, contribuindo para a melhora na estética local e estabilidade dos tecidos moles, proporcionando uma maior segurança para a movimentação ortodôntica.

Palavras-chave: Recessão periodontal. Enxerto de tecido conjunt. Ortodontia.